


FASCICULE DESCRIPTIF DE LA FAUNE DU BURKINA

Nom scientifique	Régime alimentaire Mœurs
 <p>NS : <i>Alcelaphus buselaphus</i> NF : Bubale</p>	<p>Haute antilope mince aux épaules relevées, à longue tête étroite portant des cornes épaisses striées à la base, son pelage est brun rougeâtre souvent très foncé pour les sujets adultes.</p> <p>Herbivore, il vit en troupeau. Les femelles ne font qu'un petit après une gestation de 8 mois. Les mâles et les femelles portent tous des cornes. Ce sont des animaux très sportifs car pouvant courir pendant plusieurs heures</p>
 <p>NS : <i>Hyppotragus equinus</i> NF : Antilope cheval</p>	<p>Grande antilope ayant la forme d'un cheval d'où son nom d'antilope cheval il est reconnaissable à sa face noire, sa bouche cernée de blanc et 2 taches frontales au dessus des yeux et à ses longues cornes effilées formant un V à la base et striées. La croupe est également blanchâtre des fesses jusqu'aux jarrets</p> <p>Herbivore, il vit en troupeau. Mâle et femelle portent des cornes</p>
 <p>NS : <i>Cobus kob</i> NF : cob de buffon</p>	<p>Petit cobe marron jaune dont le dessous du ventre jusqu'à la queue courte et touffue et l'intérieur des membres est blanc et tranche nettement avec le reste du pelage.</p> <p>Herbivore vivant en troupeaux généralement composé de femelles et de petits, les males sont souvent solitaires ou en petit groupe, ils ne rejoignent les femelles qu'en période de rut</p> <p>Seul le mâle seul porte des cornes en V et arquées à la base et ayant la forme d'un S renversé vue de profil. Il ne met bas qu'un seul petit après une gestation de 7 et demi environ</p>



Redunca redunca
Cob des roseaux

D'un pelage brun clair à gris, le dessous du menton, à la queue et de l'intérieur des membres sont blancs.
Ce cob vit généralement en couple monogame et quelquefois en harde provisoire de 5 à 7 femelles et quelques jeunes accompagnés d'un seul mâle adulte. Elle met bas 1 seul petit après une gestation de 7 à 7 mois et demis.
Seul le mâle porte des cornes courtes fortement arquées en avant en forme de V vue de face



Ourebia ourebi
Ourebi ou biche

Antilope craintive et très fugace, sa robe rouge brun est rayée en blanc sur le dos lui donnant la forme d'un harnais. Des taches blanches sont également présentes sur la croupe, les pattes, le bas du menton et du cou ; les femelles vivent par petit groupe. Seuls les mâles portent des cornes en spirale. Les mâles adultes sont la plupart du temps solitaires. La mise bas intervient après une gestation de 6 à 7 mois




Stragelaphus scriptus
Guib harnaché



Cephalophus natalensis
Céphalophe rouge

Antilope trapue, de couleur rouge foncé, une bande noire part du museau au sommet du front où se trouve une touffe dressée. Mâle et femelles portent de courtes cornes dressées et très pointus. Elles vivent la plupart en couple. La gestation dure 4 à 7 mois et la mise bas un petit. Cette espèce fréquente les fourrés et les zones de dense végétation.



Cobus defassa
Cob d'eau ou waterbuck

C'est l'antilope la plus aquatique. D'un pelage brun rougeâtre, son arrière train est uniformément blanc. Ils vivent en petit groupe de 5 à 10 têtes défendues par un grand mâle. Il met bas 1 petit après une gestation de 8 à 8 mois et demi. Seul le mâle porte de grandes cornes en forme de parenthèse vers l'avant



Equus grevy
Zèbre de grant

Mêmes caractéristiques qu'un âne domestique à part les rayures blanches et noires de sa robe, le zèbre est un herbivore qui vit en troupeau où chaque mâle adulte gère 3 à 4 juments. Sa gestation dure 1 an d'où est issue un seul petit



Phacochoerus aethiopicus
PHACOCHERE

ci-contre, une femelle suivée par ses petits appelés **marcassins**

Porc sauvage qui paraît nu sauf la crinière et la touffe terminale de la queue. Le phacochère est un animal très social qui vit en compagnie d'une quinzaine d'individus au plus, femelles et jeunes sous la garde d'un mâle. Animal vivant dans les forêts montagnardes, claires humides, dans les savanes herbeuses et dans les marécages, il aime fouiller le sol surtout la nuit à la recherche des racines, bulbes et fruits. Chez le phacochère, 6 jeunes au plus naissent au terme d'une gestation de 4 mois pendant toute l'année



NS : *Loxodonta africana*
NF : Eléphant d'Afrique

Régime alimentaire végétal très varié allant de la racine aux fruits (herbe, écorce, feuilles, fruits) Les éléphants vivent en troupeau de 5 à 20 individus conduit par un mâle dominant qui est le chef du troupeau et peut peser jusqu'à 5 tonnes. Vu cette masse, il lui faut environ 200 kg de végétaux et plus de 100 litres d'eau par jour. Les vieux mâles chassés. On peut aussi rencontrer des mâles solitaires. L'éléphant ne met pas qu'un petit après une gestation de 22 mois tous les 5 ans.




Hippopotamus amphibius
Hippopotame

C'est un animal à la peau nue très sensible et perméable laissant rapidement évaporer l'eau ce qui l'oblige dans périodes chaudes de la journée à s'immerger dans l'eau. Le mâle adulte peut peser de 1 à 1 ½ tonne



Plus haut mammifère, plus grand des ruminants impossible à confondre avec aucun autre. Elle se



Girafa camelopardalis
GIRAFE

nourrit exclusivement de feuilles qu'elle peut atteindre jusqu'à 5,7m du sol. La girafe a 3 espèces différents: il y a la girafe réticulée, la girafe masaï et l'okapi. Chez la girafe les deux sexes portent des cornes qui sont plus longues chez le male (jusqu'à 13cm). Avec l'âge les males acquièrent une corne médiane sur le front et une bosse au dessus de chaque oreille. Sa langue est préhensible de 45cm et sa queue est terminée une longue touffe. Il vit dans les savanes surtout dans les savanes à acacias dont il se nourrit et autres arbres et arbustes épineux. Côté reproduction 1 seul jeune naît (rarement des jumeaux) au terme d'une gestation de 14 à 15 mois



LIEVRE DE VICTORIA

Lièvre petit à moyen, oreilles assez longues, terminées de noir ; pelage souvent Très vivement coloré. Nuque et pattes rousses. IL vit dans les savanes humides et terres cultivées, parfois dans la savane sèche. Le lièvre de victoria est généralement solitaire. Côte reproduction, 1 à 2 jeunes naissent au terme d'une gestation de 6 semaines. Il a comme espèce proche le lièvre du cap. Pge623



Panthera leo
LION

Très gros félin robuste, au museau épais et un peu allongé. Pelage fauve lisse, dessous blanchâtre. Queue longue, portant une touffe noire à l'extrémité. Les mâles acquièrent une crinière dans leur troisième année dont la couleur varie selon les individus du blond ou noir. Vivant dans les savanes herbeuses et arborées, brousse épaisse, il mange tout ce qu'il peut capturer, des tortues aux girafes, mais a tendance à chasser les proies qu'il a appris à manger lorsqu'il était jeune et les coutumes alimentaires varient selon les troupes. Les lions sont les seuls félins véritablement sociaux. Chez les lions, 1 à 4 lionceaux (6 au plus) naissent au terme d'une gestation de 3,5 mois



Crocuta crocuta
Hyène tachetée

Considérée comme un charognard, la hyène tachetée est dotée de très fortes mâchoires qui lui permettent de briser les os et de les avaler. Après une gestation d'au moins 4 mois, elle met généralement bas 2 petits qui peuvent téter pendant 1 an ou plus



Hystrix cristata
PORC- EPIC

Gros rongeur épais, petits yeux tête arrondie, museau court, épines et piquants érectiles couvrant le sommet de la tête, le dos, et les flancs. Vivant dans les paysages vallonnés, rocheux et accidentés, parsemés de terriers et autres abris. Les porcs- épics sont nocturnes mais très repérables à cause de leur grande taille et le reflet rouge de leurs yeux à la lumière. Côte reproduction, 1 à 3 jeunes naissent pendant la saison des pluies au terme d'une gestation de 3 à 7 mois. Comme espèces proches, il y a le porc- épïc à crête et le porc- épïc à queue touffue d'Afrique.



Ateleris albiventris
HERISSON A VENTRE BLANC

Epines blanches portant une bande brune, ventre et pattes blanches, pieds postérieurs portant 4 doigts dont le pouce est absent. Ce hérisson qui chasse à l'odorat et à l'ouïe consomme quotidiennement 1/3 de son poids en insectes, escargot, champignons, en graine et en noix. Il peut même tuer de petits serpents venimeux. L'habitat du hérisson est généralement les savanes humides ponctuées de termitières et les abords des champs de cultures d'arachides et de petit pois.. La portée est de 4 à 7 jeunes qui naissent au terme d'une gestation de 5 à 6 semaines



Struthio camelopardalis
AUTRUCHE

Très gros oiseau inapte au vol, aux très longues pattes nues surmontées d'un très long cou nu. Vivant sur les plaines ouvertes semi-arides et forêts claires, le male pousse des cris résonnants qui rappellent le rugissement du lion. Les mâles territoriaux ont généralement une "favorite" et quelques autres femelles. Leur nid n'est qu'un petit creux gratté dans le sol et plusieurs femelles pondent souvent dans le même nid. Pour protéger les oeufs et les jeunes, les autruches se couchent sur le nid, cou allongé. Les autruches sont les plus gros oiseaux vivants et les seuls à ne posséder que 2 doigts. C'est aussi les plus rapide à la course (50 km/h pendant 30mn au plus)



Ardea cinera
HERON CENDRE

Grand héron gris au long bec jaune et longues pattes jaunes. En plumage nuptial, le bec et les pattes deviennent rouge orange et le dos et le cou portent de longues plumes blanches lancéolées. Très patient, il chasse généralement seul et se nourrit de mollusque, de petits poissons, d'insectes. Il se trouve sur les rives des fleuves et rivières, lacs, étangs ; également sur les marais côtiers et les plages. Pour leur reproduction, le héron construit une plateforme de branchages dans un arbre et couve 3 à 4 œufs pendant 25 jours Pge658



Leptoptilos crumeniferus
MARABOUT

Très gros oiseaux, dos et ailes gris ardoise, tête nue rouge mouchetée de noir, cou nu rose. Se trouvant dans les savanes, rivages et villes, il construit un nid de branchages, vit en colonies qui compte entre 20 et plusieurs milliers d'oiseaux et pond 2 ou3 œufs. Il se nourrit de poisson, de batraciens, de mollusques.



Milvus migrans parasitus
MILAN NOIR

Ils sont Plusieurs sous espèces, mais aucune n'est noire. Certains, le bec noir, d'autres le Bec Jaune. Tous ont les pattes courtes et jaunes, comme les pieds. Ils vivent dans les Villes, villages au bord de l'eau, dans la savane et se nourrissent de rats, lézards, petits oiseaux, poissons et gros insectes et font quelques fois des descentes dans les basse cours



Haliaeetus vocifer
AIGLE PECHEUR VOCIFIERE

D'un long bec, de grands pieds, bande noire à l'extrémité de sa queue. Il se trouve dans les lacs et rivières. Cet aigle capture de jeunes flamants, canards, crocodiles, varans et tortues. Les bons jours, il peut pêcher 2 rations quotidiennes de poissons en 10 minutes environs.



Gyps africanus
VAUTOUR AFRICAIN

C'est le grand vautour le plus fréquent en Afrique. Bec et œil noirs, bas dos et croupion blancs, face et gorge sombre. Vivants des les plaines et dans les zones boisées où vivent les grands troupeaux sauvages ou domestiques. Jusqu'à 200 vautours peuvent s'assembler autour d'une carcasse. Il se reproduit en construisant un fragile nid de branchage au sommet d'un arbre et couve 1 œuf pendant 56 jours.



Terathopus escaudatus
AIGLE BATELEUR

C'est le plus beau des rapaces. Enorme tête, ailes pointues très longues, la queue marron très courte lorsqu'il est perché, face nue rouge vif, comme la base du bec courtes pattes rouge vif. Vit dans les forêts claires avec hautes herbes ou les brousses à épineux épais, l'aigle bateleur doit son nom au balancement qu'il prend au vol. il peut parcourir jusqu'à 400 km et se nourrit de lièvres, pintades, outardes, tourterelles, varans et insectes. Côte reproduction, il n'élève qu'1 jeune



AIGLE RAVISSEUR :

Grand aigle de couleur variable des zones arides, aux pattes « fourrées », cire, coin du bec et pied jaunes. L'aigle ravisseur est l'aigle brun le plus fréquent d'Afrique. C'est une machine à tuer très efficace et il capture des mangoustes, lièvres, jeunes gazelles, serpents, lézards, criquets et des poussins. Il vit dans les plaines et à côté des habitations où il effectue de fréquents prélèvements dans la basse cours



PINTADE COMMUNE :

Entièrement saupoudrée de taches blanches, peau nue de la tête bleu vif, blanche ou rouge, casque osseux sur le sommet de la tête. La nuit, les pintades se perchent à plusieurs dans un arbre. Elle se nourrit De graines, de tubercules et d'insectes. Elle vit dans tous types de savane humide ou semi- aride. Côte reproduction, la femelle gratte le sol sous un épais couvert végétal pour faire un creux qu'elle tapisse de plumes et d'herbes et y pond une douzaine d'œufs au plus.



Eupodotis melanogaster
OUTARDE

Le mâle à la face blanche cerclée de noir, le cou et la poitrine bleu, le ventre est blanc.

La femelle est orange fauve sur la tête et le cou, bec rouge et ventre blanc. Il vit en couple dans les savanes arborées, savanes herbeuses et aux abords des champs.

La femelle pond 2 oeufs dans un petit creux qu'elle creuse sur le sol nu.



Pterocles decoratus
GANGA

Mâle fauve dessous, finement barré de noir, base du bec et gorge noire, ventre noir. Femelle fauve finement barré de noir. Cet oiseau passe la journée à l'ombre d'un rocher ou d'un arbre. Il se nourrit de graines et se trouve dans la brousse épineuse aride, semi-désertique et dunes.

Côté reproduction, il niche en solitaire, 2 ou 3 œufs pondus dans une dépression dans le sol nu près de rochers ou d'arbres



Streptopelia senegalensis
TOURTERELLE MAILLÉE

Tête et dessous rose pâle, bord d'attaque de l'aile bleuâtre. Petites taches noires groupées sur l'avant du cou. La tourterelle maillée est l'un des oiseaux africains les plus fréquents, tant en ville que dans les zones rurales en couple probablement formé pour la vie.

Généralement la femelle pond 2 oeufs dans un fragile nid de branchages. Comme espèce proche il y a la tourterelle des bois.



Bulcus ivis

Héron garde bœuf ou pic boeuf

De couleur entièrement blanche, ce sont des oiseaux familiers des bergers, ils sont toujours dans les troupeaux de vaches ou de moutons qu'ils suivent pour les débarrasser des tics et se nourrissent également des criquets et des insectes qui s'envolent au passage du troupeau.

Coté reproduction, la femelle pond 2 œufs qu'elle couve dans un fragile nid de branchage dans la cime des arbres. Cette espèce vit en colonie de plusieurs individus et on peut retrouver des centaines le soir au couché du soleil bataillants dans un grand vacarme pour la place pour passer la nuit.



Croditus niloticus

Crocodile

Appelés à torts Caïman, ces sauriens passent la majeure partie de leur vie dans l'eau et même sous l'eau. Il a une respiration pulmonaire, ce qui l'oblige à remonter de temps à autre pour faire des provisions d'oxygène. Comme régime alimentaire il est ichthyophage et carnivore c'est à dire qu'il se nourrie de viande en capturant les animaux et les oiseaux qui viennent s'abreuver et de poisson. La femelle pond une dizaine d'œuf dans une petite dépression creusée sur la berge dont elle recouvre de terre et de matière végétale. Les œufs sont ainsi laissés en couveuse et les petits se démerdent seuls pour rejoindre l'eau à leur éclosion afin d'échapper à d'autres prédateurs comme les oiseaux